

CE MAGNUS forte

Komplexní listové krystalické hnojivo s mikroživinami a přidanými aminokyselinami. Používáním hnojiva v optimálních dávkách a době je možné dosáhnout vysokých výnosů a chránit rostliny před nedostatkem živin.

Viesložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinami - KFV 1(C)(I)(a)(ii).
Anorganické hnojivo NPK(S) = 5,2-20-15 (9,6) - se stopovými živinami.

Deklarovaný obsah živin podle hmotnosti:	(% hmot.)
Celkový dusík (N)	5,2
Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	1,3
Amonný dusík (N-NH ₄)	1,2
Amidický dusík (N-NH ₂)	2,7
P ₂ O ₅ rozpustný ve vodě	20,0
K ₂ O rozpustný ve vodě	15,0
MgO rozpustný ve vodě	4,0
SO ₂ rozpustný ve vodě	9,6
Celkový bór (B) rozpustný ve vodě	1,500
Celková měď (Cu) rozpustná ve vodě	1,000
Celkové železo (Fe) rozpustné ve vodě	0,180
Celkový mangan (Mn) rozpustný ve vodě	1,00
Celkový molybden (Mo) rozpustný ve vodě	0,010
Celkový zinek (Zn)	1,500

Prášek – alespoň 90 % (hm.) projde sítím s oky velikosti 1,0 mm.

SLOŽENÍ:

Fosforečnan monodraselný – č. CAS: 7778-77-0 (CMC 1; Primární surovina a směs), Monohydrát síranu hořečnatého – č. CAS: 14168-73-1 (CMC 1), Fosforečnan monoamonný – č. CAS: 7722-76-1 (CMC 1), Dusičnan draselný – č. CAS: 7757-79-1 (CMC 1), Kyselina boritá – č. CAS: 10043-35-3 (CMC 1), Močovina – č. CAS: 57-13-6 (CMC 1).

Rostlina	Termín postřiku	Dávka hnojiva (kg/ha)
Obilniny	Začátek odnožování Sloupkování Kvetení	3
Řepka, len	Začátek růstu Prodlužování růstu Zelené poupě	3÷4
Cukrová a krmná řepa	Fáze 4-10 listů Fáze 10-14 listů Před uzavřením řádků Po celou dobu vegetace	3÷4
Brambory	Po celou dobu vegetace	3÷4
Kukuřice	Fáze 3-5 listů Fáze 8-10 listů	3÷4
Luštěniny	Po celou dobu vegetace	3÷4
Jahody	Konec kvetení Začátek růstu plodů	3÷4
Ovocné stromy a keře	Po celou dobu vegetace	5÷10
Kořenová zelenina	2-3 týdny po vzejití Každých 10-14 dnů - 2 aplikace	3÷4
Zelenina krytá (skleník a fóliovníky): rajčata, papriky, kurky, salát, ferkvička, celer, pažitka a další	Od 3. listu sazenice 2-3 postřiky každých 10-14 dnů	0,5-1 kg / 100 l vody
Okrasné rostliny a další	0,5-1,5 kg / 100 l vody	

Množství postřikové jichy: polní plodiny = 300-500 l/ha; sady = 400-1000 l/ha

DOPORUČENÉ PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Uchovávejte v souladu s místními právními předpisy v původním obalu. Pytle skladujte ve skladech při teplotě od 5 do 25°C na suchém a dobře větraném místě, mimo dosah zdrojů tepla a slunce.

DATUM VÝROBY/EXPIRACE:

Doba použitelnosti – 3 roky od data výroby.

DATUM VÝROBY:

DATUM EXPIRACE:



MNOŽSTVÍ:

9 kg

Výrobce:
EKOPLON Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
28-225 Szydłów, Grabki Duże 82, Polsko
tel./fax (41) 354 51 69, 312 10 89
www.ekoplon.pl

Distributor:
Auxieffect s.r.o.
Bělov 140 | 768 21 Bělov, Česká republika
Telefon: +420 608 911 949
E-mail: kasik@auxieffect.cz
www.auxieffect.cz

SPECIFICKÉ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ:

MAGNUS forte se doporučuje pro všechny plodiny.

Hnojivo se aplikuje postřikem na list. Používejte pouze v případě skutečné potřeby.
Nepřekračujte určené dávkování. Ošetření provádějte ráno nebo večer při teplotě max. 25 °C.
Min. teplota postřikové jichy 10 °C.

POKUD HODLÁTE SMÍCHAT TOTO HNOJIVO S JINÝM PŘÍPRAVKEM, PŘEVEDETE ZKOUŠKU MÍŠITELNOSTI A VYZKOUŠEJTE REAKCI ROSTLIN NA PŘÍPRAVENOU SMĚS. Doporučené dávky jsou informativní. Pro detailní informace se obraťte na výrobce.

www.ekoplon.pl

ZÁSADY PŘÍPRAVY POSTŘIKOVÉ JICHY:

Bezprostředně před postřikem naplňte nádobu postřikovače do 2/3 objemu a zapněte míchání; postupně přidávejte močovinu, hnojivo MAGNUS forte ředěné vodou v poměru 1:4, přípravek pro ochranu rostlin podle návodu (pokud bude používán a je vhodný pro smíchání), směďadlo. Dolijte vodou a zahajte postřik.

INFORMACE K BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Aby nedošlo k ohrožení zdraví lidí a životního prostředí, postupujte podle pokynů pro doporučené použití.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nejezte a nedotýkejte se očí.

Výrobek je klasifikován podle nařízení ES 1272/2008

V souladu s ES 1272/2008

MAGNUS forte

Obsahuje: kyselina boritá (CAS: 10043-35-3)



NEBEZPEČÍ!

STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:

H360FD: Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

PREVENCE:

P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

REAKCE:

P308 + P313: Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

SKLADOVÁNÍ:

P405: Skladujte uzamčené.

LIKVIDACE:

P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými právními předpisy pro třídění odpadu.

UFI KÓD: P2H0-K0TH-8006-H4CY

Ekoplon sp. z o.o. sp.k.
Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów